

trvalé následky úrazu.


Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu

Co musí trvalý následek splňovat

Pojistné krytí se vztahuje výhradně na trvalé následky úrazu, nikoli nemoci. Trvalý následek úrazu musí být po svém ustálení posouzen lékařem (ve většině případů nejdříve 12 měsíců od úrazu, vždy nejpozději 36 měsíců od úrazu) a doložen vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami. V případě fyzické ztráty může lékař trvalý následek úrazu posoudit i dříve. Například amputaci může lékař posoudit ihned, ale v případě omezení funkčnosti kloubu to může být nejdříve za 12 měsíců od úrazu.

Jak stanovíme výši pojistného plnění

Pojistné plnění stanovíme tak, že pojistnou částku vynásobíme oceněním stanoveným podle Oceňovací tabulky a koeficientem progresu stanoveným podle Tabulky koeficientů progresu. Pro trvalé následky úrazu, které v tabulce nejsou uvedeny, stanovíme ocenění podle trvalého následku úrazu, který v tabulce uveden je a svou povahou a závažností je mu nejvíce podobný. Na trvalé následky úrazu, které v tabulce nejsou uvedeny, ale je v ní uvedena jejich závažnější forma, se však pojistné krytí nevztahuje (například deformace nosu bez funkční poruchy nebo částečná ztráta čichu nebo chuti).

Aby si Oceňovací tabulka zachovala přehlednost a přijatelný rozsah, jsou ocenění některých trvalých následků úrazu uvedené určitým rozpětím (intervalem). V těchto případech stanovíme ocenění trvalého následku tak, aby v rámci daného intervalu odpovídalo jeho závažnosti (v tabulce k těmto intervallům uvádíme příklady  i s jejich přesným oceněním v rámci daného intervalu).

Jaký je postup v případě několika trvalých následků

Zanechá-li jeden úraz více trvalých následků, jednotlivá ocenění těchto trvalých následků sečteme. Součet ocenění trvalých následků jednoho úrazu však může být nejvýše 100 %. Součet ocenění několika trvalých následků úrazu jedné části těla nemůže být vyšší než ocenění úplné ztráty této části těla. Týká-li se trvalý následek úrazu části těla, která byla poškozena již před úrazem, sníží se ocenění o hodnotu odpovídající ocenění předcházejícího poškození. V ocenění za úplnou ztuhlost, omezení funkčnosti a porušení nervů jsou již zahrnuty oběhové a trofické poruchy (například svalová atrofie při omezené hybnosti končetiny apod.).

Co rozumíme následujícími pojmy

Lehké omezení funkčnosti kloubu

omezení pohyblivosti kloubu o 10–33 % ve všech rovinách pohybu v porovnání s běžným rozsahem pohybu (v případě prstů ruky chybí do úplného sevření do dlaně alespoň 1 cm, ale méně než 3 cm) nebo jakékoli omezení funkčnosti kloubu způsobené trvalým poškozením jeho měkkých tkání

Středně těžké omezení funkčnosti kloubu

omezení pohyblivosti kloubu o 34–66 % ve všech rovinách pohybu v porovnání s běžným rozsahem pohybu (v případě prstů ruky chybí do úplného sevření do dlaně alespoň 3 cm, ale méně než 4 cm)

Těžké omezení funkčnosti kloubu

omezení pohyblivosti kloubu o více než 66 % ve všech rovinách pohybu v porovnání s běžným rozsahem pohybu (v případě prstů ruky chybí do úplného sevření do dlaně alespoň 4 cm)

Oceňovací tabulka

Hlava a krk

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
1	lehké neurologické poruchy po poranění hlavy	0–15
	◇ mozková komoce, krvácení do mozku nebo kontuze mozku (vše bez trvalých neurologických poruch), epilepsie, postkomoční syndrom	0
	◇ jednostranné poškození přídatného nebo rovnovážného nervu	10
	◇ oboustranné ochrnutí měkkého patra	15
2	středně těžké neurologické poruchy po poranění hlavy	20–55
	◇ oboustranné poškození podjazykového nebo přídatného nervu, monoparéza	20
	◇ hemiparéza, středně těžký prefrontální syndrom	30
3	těžké neurologické poruchy po poranění hlavy	60–100
	◇ těžký prefrontální syndrom, monoplegie	70
	◇ trvalá umělá plicní ventilace	80
	◇ hemiplegie, apalický syndrom	100
4	úplný defekt v klenbě lebni	1–25
	◇ v rozsahu 0,5 cm ²	1
	◇ v rozsahu 15 cm ² nebo více	25
5	úplná ztráta zraku jednoho oka	35
6	částečná ztráta zraku jednoho oka (pouze světlocit)	30
7	částečná ztráta zraku jednoho oka (neostré vidění lepší než světlocit)	5–20
	◇ s optimální brýlovou korekcí – vizus 0,7	5
	◇ s optimální brýlovou korekcí – vizus 0,05	15
	◇ schopnost spočítat prsty pouze do vzdálenosti max. 1 m před okem	20
8	úplná ztráta zraku obou očí	100
9	částečná ztráta zraku obou očí (pouze světlocit)	95
10	částečná ztráta zraku obou očí (neostré vidění lepší než světlocit)	5–85
	◇ s optimální brýlovou korekcí – vizus 0,8 (obě oči)	5
	◇ s optimální brýlovou korekcí – vizus 0,3 (obě oči)	30
	◇ s optimální brýlovou korekcí – vizus 0,01 (obě oči)	81
	◇ schopnost spočítat prsty pouze do vzdálenosti max. 1 m před očima	85
11	zúžení zorného pole jednoho oka (včetně poklesu očního víčka)	0–25
	◇ zelený zákal, koncentrické zúžení k 50°	0
	◇ koncentrické zúžení k 30°	15
	◇ koncentrické zúžení k 5°	25
12	zúžení zorného pole obou očí (včetně poklesu očních víček)	10–90
	◇ zelený zákal (obě oči)	0
	◇ koncentrické zúžení k 60° (obě oči)	10
	◇ koncentrické zúžení k 30° (obě oči)	45
	◇ koncentrické zúžení k 5° (obě oči)	90

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
13	úplná ztráta čočky jednoho oka	5–25
	◇ se snášenlivostí kontaktní čočky alespoň 8 hodin	5
	◇ se snášenlivostí kontaktní čočky alespoň 4–8 hodin (do 45 let/jinak)	15/10
	◇ se snášenlivostí kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně (do 45 let/jinak)	20/15
	◇ s úplnou nesnášenlivostí kontaktní čočky (do 45 let/jinak)	25/20
14	poškození zornice jednoho oka s funkční poruchou	0–10
	◇ nepravidelný tvar až úplný zánik zornice z důvodu ztráty méně než 1 % duhovky	0
	◇ nepravidelný tvar až úplný zánik zornice z důvodu ztráty 1–14 % duhovky	5
	◇ rozšíření nebo ochrnutí zornice	5
	◇ nepravidelný tvar až úplný zánik zornice z důvodu ztráty víc než 50 % duhovky	10
15	porušení průchodnosti slzných cest jednoho oka	5–10
	◇ v oblasti horního víčka	5
	◇ v oblasti dolního víčka	10
16	nesprávné postavení očních víček na jednom oku, které nelze operativně odstranit	0–15
	◇ změna tvaru oční štěrbinu jednoho oka bez poruchy ochranné funkce oka a bez dráždění řasami	0
	◇ oční víčko odvrácené od oka	5
	◇ oční víčko stočené k oku	15
17	nedovírání jednoho očního víčka (lagofthalmus), které nelze operativně odstranit	2–10
	◇ lagofthalmus do 3 mm	2
	◇ lagofthalmus 3–7 mm	5
	◇ lagofthalmus nad 7 mm	10
18	těžké kosmetické defekty jednoho oka	5–25
	◇ ptóza očního víčka, pokud nekryje zornici	5
	◇ deformace očnice	10
	◇ srůsty spojivky, chybějící duhovka	15
	◇ rohovková protéza po poleptání oka	25
19	poškození trojklanného nervu	5–15
	◇ poškození jedné větve	5
	◇ poškození dvou větví	10
	◇ poškození tří větví	15
20	poškození okohybných nervů	5–25
	◇ lehké poškození	5
	◇ dvojité vidění jen při určitém úhlu pohledu	15
	◇ dvojité vidění svisle nebo vodorovně	25
21	poškození lícního nervu	10–15
	◇ lehké poškození	10
	◇ středně těžké poškození	12
	◇ těžké poškození	15

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
22	úplná nebo částečná ztráta nosu (včetně ztráty čichu nebo chuti) nebo jeho deformace s funkční poruchou	5–20
	◇ částečná ztráta bez poruchy průchodnosti	5
	◇ částečná ztráta s těžkou poruchou průchodnosti	10
	◇ úplná ztráta bez poruchy dýchání	15
	◇ úplná ztráta s poruchou dýchání	20
23	perforace nosní přepážky	5
24	úplná ztráta čichu nebo chuti	10
25	úplná nebo částečná ztráta sluchu jednoho ucha	0–15
	◇ lehká ztráta do 40 dB	0
	◇ středně těžká ztráta 41–60 dB	5
	◇ těžká ztráta 61–95 dB	12
	◇ úplná ztráta	15
26	úplná nebo částečná ztráta sluchu obou uší	5–40
	◇ tinnitus (obě uši)	0
	◇ lehká ztráta 26–40 dB (obě uši)	5
	◇ středně těžká ztráta 41–60 dB (obě uši)	20
	◇ těžká ztráta 61–95 dB (obě uši)	35
	◇ úplná ztráta (obě uši)	40
27	perforace ušního bubínku	5
28	úplná ztráta jednoho ušního boltce	10
29	úplná ztráta obou ušních boltců	15
30	úplná nebo částečná ztráta jazyka (včetně ztráty chuti nebo mluvení)	0–40
	◇ lehká deformace jazyka bez ztráty chuti a mluvení	0
	◇ ztráta méně než čtvrtiny jazyka	5
	◇ ztráta poloviny jazyka	25
	◇ úplná ztráta jazyka	40
31	ztráta celého zubu nebo jeho části, pokud vede ke ztrátě jeho vitality	2
32	ztráta části zubu, která nevede ke ztrátě jeho vitality, nebo ztráta či poškození dočasných (mléčných) zubů nebo zubních náhrad	0
33	jiný trvalý následek s funkční poruchou po poranění obličeje	10–40
	◇ omezení pohyblivosti čelisti s možností oddálení čelistí do 1 cm	10
	◇ deformace rtů s trvalým výtokem slin	25
	◇ ztráta více jak poloviny dolní čelisti	40
34	úplná nebo částečná ztráta hlasu nebo mluvení po poranění hlasivek	10–25
	◇ částečná ztráta hlasu, poruchy hlasu	10
	◇ úplná ztráta hlasu nebo mluvení	25
35	trvalá tracheostomie	50
36	zúžení hrtanu nebo průdušnice (včetně ztráty hlasu nebo mluvení po poranění hlasivek a tracheostomie)	15–65
	◇ lehké zúžení bez ztráty hlasu a mluvení	15
	◇ středně těžké zúžení se ztrátou hlasu nebo mluvení	30
	◇ těžké zúžení s trvalou tracheostomií	65

Trup

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
37	úplná nebo částečná ztráta jednoho prsu	0–15
	◇ částečná ztráta u muže	0
	◇ částečná ztráta u ženy ve věku 46 let nebo vyšším	5
	◇ částečná ztráta u ženy ve věku 45 let nebo nižším	10
	◇ úplná ztráta u ženy	15
38	omezení pohyblivosti hrudníku se srůsty plic a hrudní stěny	5–20
	◇ lehké omezení	5
	◇ středně těžké omezení	15
	◇ těžké omezení	20
39	jiný trvalý následek po poranění jedné plic	15–40
	◇ lehké omezení funkce do 10 %	15
	◇ středně těžké omezení funkce 10–25 %	30
	◇ těžké omezení funkce nad 25 %	40
40	jiný trvalý následek po poranění obou plic	25–100
	◇ lehké omezení funkce do 25 %	25
	◇ středně těžké omezení funkce 25–80 %	60
	◇ těžké omezení funkce nad 80 %	100
41	lehké srdeční nebo cévní poruchy způsobené přímým poraněním	10–20
	◇ komoce nebo kontuze srdce (vše s lehkým poklesem výkonnosti)	10
	◇ aortální disekce bez rozšíření aory a bez orgánové dysfunkce	20
42	středně těžké srdeční nebo cévní poruchy způsobené přímým poraněním	25–45
	◇ trhlina srdečního svalu se středně těžkým poklesem výkonnosti	25
	◇ aortální disekce s rozšířením aorty a s lehkou orgánovou dysfunkcí	45
43	těžké srdeční nebo cévní poruchy způsobené přímým poraněním	50–100
	◇ srdeční tamponáda, tensní pneumotorax nebo hemotorax (vše s těžkým poklesem výkonnosti)	50
	◇ aortální disekce s těžkou orgánovou dysfunkcí	100
44	úplná nebo částečná ztráta sleziny	0–15
	◇ částečná ztráta bez funkční poruchy	0
	◇ částečná ztráta s lehkou funkční poruchou	2
	◇ částečná ztráta se středně těžkou funkční poruchou	5
	◇ částečná ztráta s těžkou funkční poruchou	10
	◇ úplná ztráta	15
45	zúžení jícnu	10–60
	◇ lehké zúžení	10
	◇ středně těžké zúžení	30
	◇ těžké zúžení	60
46	píštěl jícnu	30
47	porušení funkce břišní stěny s poruchou břišního lisu	20
48	kýla	0

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
49	jiný trvalý následek po poranění trávicích orgánů	10–100
	◇ ztráta částí jater s lehkou funkční poruchou	10
	◇ částečná nedomykavost řítních svěračů	15
	◇ poškození slinivky s funkční poruchou	20
	◇ ztráta částí jater s těžkou funkční poruchou	40
	◇ úplná nedomykavost řítních svěračů, trvalá kolostomie	60
	◇ trvalá ileostomie	80
50	úplná nebo částečná ztráta funkce jedné ledviny	0–25
	◇ částečná ztráta funkce s lehkou funkční poruchou	0
	◇ částečná ztráta funkce s středně těžkou funkční poruchou	10
	◇ částečná ztráta funkce s těžkou funkční poruchou	20
	◇ úplná ztráta funkce	25
51	úplná nebo částečná ztráta funkce obou ledvin	0–100
	◇ bez funkční poruchy	0
	◇ částečná ztráta funkce s lehkou funkční poruchou (obě ledviny)	10
	◇ částečná ztráta funkce s středně těžkou funkční poruchou (obě ledviny)	40
	◇ částečná ztráta funkce s těžkou funkční poruchou (obě ledviny)	80
	◇ úplná ztráta funkce (obě ledviny)	100
52	píštěl močového měchýře nebo močové trubice	50
53	jiný trvalý následek po poranění ledvin nebo močových cest	10–50
	◇ lehký následek	10
	◇ středně těžký následek	20
	◇ těžký následek, trvalá ureostomie	50
54	lehké poškození pohlavních orgánů	0–15
	◇ lehká deformace penisu	5
	◇ lehká deformace pochvy, ztráta jednoho vaječníku	10
	◇ úplná ztráta dělohy ve věku 46 let nebo vyšším	15
	◇ úplná ztráta penisu ve věku 60 let nebo vyšším	15
55	středně těžké poškození pohlavních orgánů	20–30
	◇ úplná ztráta obou varlat ve věku 46–59 let	25
	◇ středně těžká deformace pochvy nebo úplná ztráta obou vaječnicků (vše ve věku 46 let nebo vyšším)	25
	◇ úplná ztráta penisu ve věku 46–59 let	30
56	těžké poškození pohlavních orgánů	35–50
	◇ úplná ztráta obou varlat ve věku 45 let nebo nižším	40
	◇ úplná ztráta obou vaječnicků ve věku 45 let nebo nižším	45
	◇ úplná ztráta penisu / dělohy ve věku 45 let nebo nižším	50
57	porušení souvislosti pánevního prstence s lehkou poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin	15–20
	◇ ženy do 45 let	20
	◇ ostatní	15
58	porušení souvislosti pánevního prstence se středně těžkou poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin	25–35
	◇ ženy do 45 let	35
	◇ ostatní	25

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
59	porušení souvislosti pánevního prstence s těžkou poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin	40–55
	◇ ženy do 45 let	55
	◇ ostatní	40
60	lehké poškození páteře, míchy, míšních plen nebo kořenů s trvalými neurologickými příznaky	10–30
	◇ lehké omezení pohyblivosti páteře	10
	◇ paraparéza	30
61	středně těžké poškození páteře, míchy, míšních plen nebo kořenů s trvalými neurologickými příznaky	35–55
	◇ středně těžké omezení pohyblivosti páteře	35
	◇ kvadruparéza	55
62	těžké poškození páteře, míchy, míšních plen nebo kořenů s trvalými neurologickými příznaky	60–100
	◇ těžké omezení pohyblivosti páteře	60
	◇ kvadruplegie, paraplegie	100

Horní končetina

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
63	úplná ztráta horní končetiny v loketním kloubu nebo nad ním	70
64	úplná ztuhlost ramenního kloubu	30
65	lehké omezení funkčnosti ramenního kloubu	5
66	středně těžké omezení funkčnosti ramenního kloubu	10
67	těžké omezení funkčnosti ramenního kloubu	18
68	náhrada ramenního kloubu	15
69	pakloub pažní kosti	40
70	viklavost ramenního kloubu	10–20
	◇ alespoň 3 luxace ramenního kloubu vyžadující repozici lékařem	10
	◇ 4 luxace ramenního kloubu vyžadující repozici lékařem	15
	◇ 5 nebo více luxací ramenního kloubu vyžadující repozici lékařem	20
71	nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární	6
72	nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární	3
73	úplná ztráta horní končetiny mezi loketním kloubem a zápěstím	60
74	úplná ztuhlost loketního kloubu	25
75	úplná ztuhlost radioulnárních kloubů	20
76	lehké omezení funkčnosti loketního kloubu	5
77	středně těžké omezení funkčnosti loketního kloubu	12
78	těžké omezení funkčnosti loketního kloubu	20
79	náhrada loketního kloubu	15
80	pakloub vřetenní kosti	30
81	pakloub loketní kosti	20

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
82	viklavost loketního kloubu	15–25
	◇ lehké omezení	15
	◇ středně těžké omezení	20
	◇ těžké omezení	25
83	úplná ztráta ruky v zápěstí	50
84	úplná ztráta palce ruky nebo úplná ztuhlost všech jeho kloubů	18
85	úplná ztráta koncového článku palce ruky	7
86	úplná ztráta všech prstů ruky kromě palce	40
87	úplná ztráta prstu ruky (kromě palce) nebo úplná ztuhlost všech jeho kloubů	8
88	úplná ztráta dvou článků prstu ruky (kromě palce)	6
89	úplná ztráta koncového článku prstu ruky (kromě palce)	3
90	úplná ztuhlost zápěstí	20
91	úplná ztuhlost kloubu palce ruky	6
92	úplná ztuhlost kloubu prstu ruky (kromě palce)	1
93	lehké omezení funkčnosti zápěstí	5
94	středně těžké omezení funkčnosti zápěstí	15
95	těžké omezení funkčnosti zápěstí	18
96	lehké omezení funkčnosti kloubu prstu ruky	1
97	středně těžké omezení funkčnosti kloubu prstu ruky	3
98	těžké omezení funkčnosti kloubu prstu ruky	6
99	náhrada zápěstí	15
100	náhrada kloubu prstu ruky	3
101	pakloub člunkové kosti	15
102	viklavost zápěstí	5–15
	◇ lehké omezení	5
	◇ středně těžké omezení	10
	◇ těžké omezení	15
103	poškození pažního nervu	0–30
	◇ bez poruchy funkce a citlivosti	0
	◇ pouze s poruchou citlivosti	3
	◇ s částečným poškozením funkce	15
	◇ s poškozením funkce všech inervovaných svalů	30
104	poškození kmene vřetenního nervu	0–35
	◇ bez poruchy funkce a citlivosti	0
	◇ pouze s poruchou citlivosti	3
	◇ s poruchou funkce palcových svalů	10
	◇ s poškozením funkce všech inervovaných svalů	35

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
105	poškození muskulokutánního nervu	0–30
	◇ bez poruchy funkce a citlivosti	0
	◇ pouze s poruchou citlivosti	3
	◇ s částečným poškozením funkce (bez poruchy funkce dvojhlavého pažního svalu)	15
	◇ s poškozením funkce všech inervovaných svalů	30
106	poškození kmene loketního nervu	0–35
	◇ bez poruchy funkce a citlivosti	0
	◇ pouze s poruchou citlivosti	3
	◇ s poškozením pouze distální části nervu	25
	◇ s poškozením funkce všech inervovaných svalů	35
107	poškození kmene středního nervu	0–30
	◇ bez poruchy funkce a citlivosti	0
	◇ pouze s poruchou citlivosti	3
	◇ s poškozením pouze distální části nervu	15
	◇ s poškozením funkce všech inervovaných svalů	30
108	poškození nervů ramenního pletence	0–10
	◇ bez poruchy funkce a citlivosti	0
	◇ pouze s poruchou citlivosti	1
	◇ s poškozením nervů nadklíčkového svazku	5
	◇ s poškozením funkce všech inervovaných svalů	10

Dolní končetina

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
109	úplná ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo nad ním nebo deformace stehenní kosti s vychýlením od fyziologické normy větším než 45°	60
110	úplná ztuhlost kyčelního kloubu	35
111	lehké omezení funkčnosti kyčelního kloubu	10
112	středně těžké omezení funkčnosti kyčelního kloubu	20
113	těžké omezení funkčnosti kyčelního kloubu	30
114	náhrada kyčelního kloubu	15
115	pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice	40
116	zkrácení dolní končetiny o 1 cm až 4 cm	1–5
	◇ zkrácení o 1 cm	1
	◇ zkrácení o 2 cm	3
	◇ zkrácení o 3 cm	4
	◇ zkrácení o 4 cm	5
117	zkrácení dolní končetiny o 4 cm až 6 cm	5–15
	◇ zkrácení o 4 cm	5
	◇ zkrácení o 5 cm	10
	◇ zkrácení o 6 cm	15

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
118	zkrácení dolní končetiny o 6 cm nebo více	15–25
	◇ zkrácení o 6 cm	15
	◇ zkrácení o 7 cm	18
	◇ zkrácení o 8 cm	20
	◇ zkrácení o 9 cm	23
	◇ zkrácení o 10 cm nebo víc	25
119	deformace stehenní kosti s vychýlením od fyziologické normy 5° až 45°	5–60
	◇ s vychýlením 5°	5
	◇ s vychýlením 30°	30
	◇ s vychýlením 31°	32
	◇ s vychýlením 45°	60
120	úplná ztráta dolní končetiny mezi kolenním a hlezenním kloubem nebo deformace kostí bérce s vychýlením od fyziologické normy větším než 45°	50
121	úplná ztuhlost kolenního kloubu	25–30
	◇ v ohnutí do 20°	25
	◇ v ohnutí 21–30°	27
	◇ v ohnutí nad 30°	30
122	lehké omezení funkčnosti kolenního kloubu	8
123	středně těžké omezení funkčnosti kolenního kloubu	12
124	těžké omezení funkčnosti kolenního kloubu	25
125	náhrada kolenního kloubu	15
126	pakloub holenní kosti	40
127	pakloub lýtkové kosti	5
128	viklavost kolenního kloubu způsobená porušením funkce předního nebo zadního zkříženého vazy	10–20
	◇ pozitivní Lachman 1. stupně	10
	◇ pozitivní Lachman 2. stupně	15
	◇ pozitivní Lachman 3. stupně	20
129	viklavost kolenního kloubu způsobená porušením funkce postranního vazy	5
130	porušení funkce kolenního kloubu po operativním odstranění jednoho menisku	3
131	jiný trvalý následek s funkční poruchou po poranění jednoho menisku	2
132	jiný trvalý následek s funkční poruchou po poranění obou menisků	3
133	deformace kostí bérce s vychýlením od fyziologické normy 5° až 45°	5–50
	◇ vychýlení 5°	5
	◇ vychýlení 40°	40
	◇ vychýlení 41°	42
	◇ vychýlení 45°	50
134	úplná ztráta nohy v hlezenním nebo v Chopartově kloubu	30
135	úplná ztráta nohy v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25
136	úplná ztráta palce nohy se záprstní kostí	15
137	úplná ztráta palce nohy	10

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
138	úplná ztráta koncového článku palce nohy	3
139	úplná ztráta malíku nohy se záprstní kostí	10
140	úplná ztráta prstu nohy (kromě palce)	2
141	úplná ztráta dvou článků nebo koncového článku prstu nohy (kromě palce)	0
142	úplná ztuhlost hlezenního kloubu	20–30
	◇ v příznivém postavení	20
	◇ v pravoúhlém postavení	25
	◇ v nepříznivém postavení	30
143	úplná ztuhlost mezičláňkového kloubu palce nohy	3
144	úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy	7
145	úplná ztuhlost kloubu prstu nohy (kromě palce)	0
146	lehké omezení funkčnosti hlezenního kloubu	5
147	středně těžké omezení funkčnosti hlezenního kloubu	10
148	těžké omezení funkčnosti hlezenního kloubu	18
149	lehké omezení funkčnosti kloubu palce nohy	1
150	středně těžké omezení funkčnosti kloubu palce nohy	3
151	těžké omezení funkčnosti kloubu palce nohy	6
152	lehké, středně těžké nebo těžké omezení funkčnosti kloubu prstu nohy (kromě palce)	0
153	náhrada hlezenního kloubu	15
154	viklavost hlezenního kloubu	0–20
	◇ velmi lehké omezení	0
	◇ lehké omezení	5
	◇ středně těžké omezení	12
	◇ těžké omezení	20
155	deformace kostí hlezenního kloubu nebo nohy	0–25
	◇ lehká deformace bez funkční poruchy	0
	◇ plochá noha	5
	◇ vybočená nebo vbočená noha	15
	◇ těžká deformace	25
156	poškození sedacího nervu	0–50
	◇ bez poruchy funkce a citlivosti	0
	◇ pouze s poruchou citlivosti	5
	◇ s částečnou poruchou funkce prstů nohy nebo kotníku	20
	◇ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů	50
157	poškození stehenního nervu	0–30
	◇ bez poruchy funkce a citlivosti	0
	◇ pouze s poruchou citlivosti	3
	◇ s poruchou extenze kolene	20
	◇ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů	30

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
158	poškození obturatorního nervu	0–20
	◇ bez poruchy funkce a citlivosti	0
	◇ pouze s poruchou citlivosti	2
	◇ s částečným poškozením funkce všech inervovaných svalů	10
	◇ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů	20
159	poškození kmene nervu holenního	0–35
	◇ bez poruchy funkce a citlivosti	0
	◇ pouze s poruchou citlivosti	3
	◇ s poruchou funkce prstů	15
	◇ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů	35
160	poškození kmene nervu lýtkového	0–30
	◇ bez poruchy funkce a citlivosti	0
	◇ pouze s poruchou citlivosti	3
	◇ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů	30
161	poškození hluboké větve nervu lýtkového	0–20
	◇ bez poruchy funkce a citlivosti	0
	◇ pouze s poruchou citlivosti	2
	◇ s částečným poškozením funkce všech inervovaných svalů	10
	◇ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů	20
162	poškození povrchové větve nervu lýtkového	0–10
	◇ bez poruchy funkce a citlivosti	0
	◇ pouze s poruchou citlivosti	1
	◇ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů	10
163	pouřazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině	0–15
	◇ chronický zánět kostní dřene	0
	◇ trofické poruchy svalstva bérce	3
	◇ trofické poruchy svalstva stehna	10
	◇ těžká porucha	15

Ostatní

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
164	plošná jizva větší než 0,5 % povrchu těla	1–40
	◇ od 0,5 % do 1 % povrchu těla	1
	◇ od 1 % do 14 % povrchu těla	1–14
	◇ od 15 % do 18 % povrchu těla	16–22
	◇ od 19 % do 24 % povrchu těla	25–38
	◇ 25 % povrchu těla nebo více	40
	◇ částečná skalpace hlavy nad 50 % povrchu hlavy	20
	◇ úplná skalpace hlavy	30

Položka	Trvalý následek úrazu	Ocenění v %
165	hypertrofická nebo keloidní podélná jizva v obličeji nebo na krku delší než 1 cm	1–20
	◇ od 1 cm do 2 cm	1
	◇ od 3 cm do 7 cm	2–6
	◇ od 8 cm do 19 cm	8–19
	◇ 20 cm nebo více	20
166	hypertrofická nebo keloidní podélná jizva mimo obličej a krk delší než 8 cm	1–10
	◇ od 8 cm do 10 cm	1
	◇ od 11 cm do 12 cm	2
	◇ od 13 cm do 19 cm	3–5
	◇ od 20 cm do 24 cm	6
	◇ od 25 cm do 29 cm	7
	◇ od 30 cm do 34 cm	8
	◇ od 35 cm do 39 cm	9
	◇ 40 cm nebo více	10
167	jiná jizva nebo pigmentační změna	0

Tabulka koeficientů progresu

Ocenění v %	Koeficient progresu
0–15	1,00
16–20	1,50
21–30	2,00
31–40	3,00
41–50	4,00
51–60	5,00
61–70	6,00
71–80	7,00
81–90	8,00
91–100	10,00